

Anlagen

Anlage 2b

Traumatologische Fallbeispiele

Stand 24. Februar 2014

1.
Kopfplatzwunde

Verletzung der Weichteile (Haut) im Bereich des Kopfes

Symptome: blutende Wunde am Kopf; keine Vigilanzminderung; keine Amnesie; keine vegetativen Symptome

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung

Therapie: Blutstillung / Verband; Lagerung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I31; I35; sowie H5; H15; H25

2.
Skalpierungsverletzung

Verletzung der Weichteile (Haut) im Bereich des Kopfes mit Loslösung eines größeren Hautareals

Symptome: blutende Wunde mit Ablösung eines Hautareals am Kopf; keine Vigilanzminderung; keine Amnesie; keine vegetativen Symptome

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ - Messung

Therapie: Blutstillung / Verband; Lagerung; Chirurgische Versorgung veranlassen

Kombinierbar mit: I14; I24; I39; sowie H4; H14; H26

3.
SHT I°

Entspricht einer Schädelprellung mit Commotio cerebri

Symptome: ggf. blutende Wunde am Kopf; ggf. kurzzeitige Vigilanzminderung;
retrograde Amnesie; leichte vegetativen Symptome

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. Blutstillung / Verband; Lagerung; Ruhigstellung der HWS; weitere
ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I6; I16; sowie H3; H9; H21

4.
SHT II°

Entspricht einer schweren Schädelprellung mit Contusio cerebri

Symptome: ggf. blutende Wunde am Kopf; deutliche länger andauernde
Vigilanzminderung; retrograde Amnesie; vegetativen Symptome

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. Blutstillung / Verband; Lagerung; Ruhigstellung der HWS; ggf. i.v.
Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I1; I25; I41 sowie H10; H13; H27

5.
SHT III°

Entspricht einer massiven Schädelprellung mit Compressio cerebri

Symptome: ggf. blutende Wunde am Kopf; Bewusstlosigkeit ; Hirndrucksymptomatik;
Pupillendifferenz; Atemdepression; ggf. Bradycardie

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: ggf. Blutstillung / Verband; Lagerung; Ruhigstellung der HWS; Atemwegs-
Sicherung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie
veranlassen

Kombinierbar mit: I8; I15; I40 sowie H11; H12; H18

6.
Gesichtsverletzung

Weichteilverletzung und /oder V.a. knöcherne Verletzung im Gesichtsbereich

Symptome: ggf. blutende Wunde im Gesicht; Schmerzen; keine Atemwegsgefährdung;
keine Vigilanzminderung; ggf. vegetative Symptomatik

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung

Therapie: ggf. Blutstillung / Verband; Lagerung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I12; I33; I42 sowie H1; H7; H20

7.
Gesichtsverletzung (schwer)

Weichteilverletzung und knöcherne Verletzung im Gesichtsbereich

Symptome: blutende Wunde im Gesicht; Schmerzen; Atemwegsgefährdung; ggf. Vigilanzminderung; ggf. vegetative Symptomatik

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung

Therapie: Blutstillung / Verband; Lagerung; Ruhigstellung der HWS; Atemwegsicherung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I7; I23; sowie H8; H17; H22

8.
Schenkelhalsfraktur

Fraktur des Schenkelhalses (proximales Femurende)

Symptome: Schmerzen in der betroffenen Hüfte; Bein Außenrotiert, verkürzt

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I10; I30; sowie H2; H24; H28

9.
Humerus-Fraktur

Fraktur des Oberarms

Symptome: Schmerzen in der betroffenen Schulter / im betroffenen Arm;
Schonhaltung; ggf. Dislokation

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente;
weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I9; I27; sowie H6; H13; H16

10.
Femur-Fraktur

Fraktur des Oberschenkels (hier Schaft-Fraktur)

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bein; Schonhaltung; ggf. Dislokation

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente;
weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I11; I17; sowie H3; H9; H23

11.
Radius-Fraktur

Fraktur des Unterarms im Bereich der Speiche

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Unterarm; Schonhaltung; ggf. Dislokation

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I4; I24; I31 sowie H1; H6; H23

12.
Sprunggelenks-Fraktur

Fraktur des Oberen / unteren Sprunggelenks

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Sprunggelenk; Schonhaltung; ggf. Dislokation

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I12; I19; I41 sowie H5; H15; H24

13.
Olecranon-Fraktur

Fraktur des Ellenbogens

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Ellenbogen; Schonhaltung; ggf. Dislokation

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente;
weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I13; I26; I42 sowie H2; H8; H21

14.
Prellung

Prellung einer Körperregion ohne Verletzung der Haut

Symptome: Schmerzen in der betroffenen Region; ggf. Schonhaltung;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I5; I33; I39 sowie H14; H23; H25

15.
Schulterluxation

Ausrenkung der Schulter

Symptome: Schmerzen in der betroffenen Schulter; Schonhaltung; ggf. leere Gelenkpfanne;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I6; I22; sowie H10; H17; H18

16.
Schulterluxation (schwer)

Ausrenkung der Schulter

Symptome: starke Schmerzen in der betroffenen Schulter; Schonhaltung; ggf. leere Gelenkpfanne;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; ggf. Reposition; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I2; I23; I32 sowie H4; H11; H22

17.
z.N. Patellarluxation

Zustand nach Ausrenkung der Kniescheibe

Symptome: starke Schmerzen in dem betroffenen Knie; Schonhaltung;
Bewegungseinschränkung

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I18; I35; sowie H7; H12; H19

18.
Patellarluxation

Ausrenkung der Kniescheibe

Symptome: starke Schmerzen in dem betroffenen Knie; Schonhaltung;
Bewegungseinschränkung; „leeres Gelenk“

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Reposition; ggf.
Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I3; I8; I25 sowie H3; H20; H26

19.
Hüftluxation nach TEP

Ausrenkung eines endoprothetisch versorgten Hüftgelenks

Symptome: starke Schmerzen in der betroffenen Hüfte; Bewegungseinschränkung; „leeres Gelenk“;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I14; I36; sowie H4; H20; H27

20.
Luxationsfraktur

Gelenksnahe Fraktur im Extremitätenbereich mit Luxation im betroffenen Gelenk

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; Bewegungseinschränkung; „leeres Gelenk“;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I20; I30; sowie H5; H9; H25

21.
Luxationsfraktur (schwer)

Gelenksnahe Fraktur im Extremitätenbereich mit Luxation im betroffenen Gelenk; ggf. als offene Fraktur

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; Bewegungseinschränkung; „leeres Gelenk“; ggf. Blutung; DMS Verlust

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente; ggf. Reposition; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I13; I28; I40 sowie H1; H7; H23

22.
HWS Distorsion

Muskuläre Verspannung an der HWS durch Beschleunigungstrauma

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; Bewegungseinschränkung;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; ggf. Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I20; I36; sowie H8; H14; H22

23.
WS Trauma BWS

Verletzung im Bereich der BWS

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; ggf. Bewegungseinschränkung;
ggf. Parästhesien

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente;
weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I10; I15; sowie H2; H12; H27

24.
WS Trauma LWS

Verletzung im Bereich der LWS

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; ggf. Bewegungseinschränkung;
ggf. Parästhesien; ggf. Eingenässt;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente;
weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I2; I9; sowie H6; H11; H21

25.
WS Trauma mit spinalem Schock

Verletzung im Bereich der Wirbelsäule mit Schocksymptomatik

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; Bewegungseinschränkung;
Parästhesien; ggf. Eingenässst; Blässe; Schweißig; Hypoton; Tachycard;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Ruhigstellung; Atemwegs-Sicherung; i.v. Zugang; Infusion; ggf.
Medikamente; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I11; I29; sowie H6; H10; H16

26.
Akutes Abdomen nach stumpfer Verletzung

Prellung im Abdominal Bereich ohne innere Blutung

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; ggf. Schonhaltung; ggf. vegetative
Symptomatik

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; ggf. weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I5; I16; I33 sowie H13; H15; H19

27.

Akutes Abdomen nach stumpfer Verletzung (schwer)

Prellung im Abdominal Bereich mit V.a. innere Blutung

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; Schonhaltung; vegetative Symptomatik; Blässe; Schweißig; Hypoton; Tachycard;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I21; I34; I40 sowie H16; H17; H26

28.

Akutes Abdomen nach penetrierender Verletzung

Offene Verletzung im Abdominal Bereich mit V.a. innere Blutung

Symptome: Schmerzen in dem betroffenen Bereich; Blutung; Schonhaltung; vegetative Symptomatik; Blässe; Schweißig; Hypoton; Tachycard;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Blutstillung; ggf. i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I10; I26; I41 sowie H5; H10; H24

29.
Mehrfachverletzung

Mehrere Verletzungen, welche aber nicht vital gefährdend sind

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. Blutung; ggf. Schonhaltung; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: ggf. Lagerung; Beruhigen ;ggf. Blutstillung; ggf. Ruhigstellung; weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I4; I37; sowie H3; H8; H19

30.
Mehrfachverletzung (schwer)

Mehrere Verletzungen, welche im Schweregrad unterschiedlich sind.

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Blutung; Schonhaltung; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: ggf. Lagerung; Beruhigen ;ggf. Blutstillung; ggf. Ruhigstellung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I3; I15; I28 sowie H2; H7; H18

31.
Polytrauma

Mehrere Verletzungen, bei denen Einzelne oder die Kombination der Verletzungen vital gefährdend sind.

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. Blutung; ggf. Schonhaltung; ggf. vegetative Symptomatik; ggf. eingeschränkte Vigilanz;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen ; ggf. Blutstillung; Ruhigstellung; Atemwegs-Sicherung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I1; I21; I34 sowie H9; H14; H21

32.
Pneumothorax

Eröffnung des Pleuraspaltes mit Luftansammlung und Kollaps des betroffenen Lungenflügels

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen ; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I12; I39; sowie H4; H13; H18

33.
Hämatothorax

Eröffnung des Pleuraspaltes mit Blutansammlung und Kollaps des betroffenen Lungenflügels

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik; ggf. Blutung bei Eröffnung nach Außen

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen ; ggf. Blutstillung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I14; I22; sowie H15; H23; H25

34.
Spannungspneumothorax

Eröffnung des Pleuraspaltes mit Luftansammlung und Kollaps des betroffenen Lungenflügels, sowie Druckanstieg in der betroffenen Seite mit Mediastinalverlagerung

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Atemnot; vegetative Symptomatik; ggf. Blutung bei Eröffnung nach außen; Schweißig; Blässe;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; ggf. Blutstillung; Atemwegs-Sicherung; ggf. Entlastung; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I8; I17; I29 sowie H1; H11; H28

35.
Sternumprellung

Prellung des Brustbeines durch z.B. ein Gurtanpralltrauma

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. Atemnot; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I18; I30; I42 sowie H6; H12; H20

36.
Sternumprellung mit Contusio cordis

Prellung des Brustbeines durch z.B. ein Gurtanpralltrauma mit Prellung des Herzens

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Atemnot; vegetative Symptomatik; ggf. Zeichen der Herzbeutel-tamponade

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I21; I27; I32 sowie H17; H22; H27

37.
Extremitätenverletzung offen

Verletzung an Arm oder Bein mit Blutung; ggf. offene Fraktur

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Blutung; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; Blutstillung, ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I23; I35; sowie H16; H24; H28

38.
Arterielle Blutung

Verletzung einer Arterie mit entsprechender Blutung - nicht vital gefährdend

Symptome: ggf. Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Blutung; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; Blutstillung, ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I4; I37; sowie H23; H19; H26;

39.
Arterielle Blutung (schwer)

Verletzung einer Arterie mit entsprechender Blutung - vital gefährdend

Symptome: ggf. Schmerzen in den betroffenen Bereichen; massive Blutung; ggf. vegetative Symptomatik; Schweißig; Blässe; Tachycard; Hypoton

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; Blutstillung, i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I19; I28; I38 sowie H3; H7; H16;

40.
Varicen Blutung

Verletzung einer Vene mit entsprechender Blutung - nicht vital gefährdend

Symptome: ggf. Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Blutung; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; Blutstillung, ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I6; I16; sowie H2; H18; H28;

41.
Varicen Blutung (schwer)

Verletzung einer Vene mit entsprechender Blutung - vital gefährdend

Symptome: ggf. Schmerzen in den betroffenen Bereichen; massive Blutung; ggf. vegetative Symptomatik; Schweißig; Blässe; Tachycard; Hypoton

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; Blutstillung, i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I26; I38; sowie H4; H8; H11;

42.
Amputation

Traumatischer Verlust eines „Gliedes“ - ohne vitale Gefährdung

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Blutung; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; ggf. Amputatversorgung; Blutstillung, ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I20; I22; I31 sowie H5; H10; H26;

43.
Amputation (schwer)

Traumatischer Verlust eines „Gliedes“ - mit vitaler Gefährdung

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Blutung; ggf. vegetative Symptomatik; Schweißig; Blässe; Tachycard; Hypoton

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; ggf. Amputatversorgung; Blutstillung, i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I7; I32; sowie H9; H12; H15;

44.
Beckenverletzung

Verletzung des Beckens ohne vitaler Gefährdung

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I18; I36; sowie H6; H13; H17;

45.
Beckenverletzung (schwer)

Verletzung des Beckens mit vitaler Gefährdung

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik;
Schweißig; Blässe; Tachycard; Hypoton

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Ruhigstellung; ggf. Beckenschlinge; i.v. Zugang;
Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I1; I9; I7 sowie H7; H14; H27;

46.
Verbrennung

Verbrennung / Verbrühung der Haut ohne vitale Gefährdung (1°-2° <20% KO)

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; ggf. Ruhigstellung; steriles Abdecken; ggf. i.v. Zugang;
ggf. Infusion; ggf. Medikamente, ggf. weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I24; I37; sowie H8; H19; H20;

47.
Verbrennung (schwer)

Verbrennung / Verbrühung der Haut mit vitaler Gefährdung (2°-3° >20% KO)

Symptome: Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik; Schweißig; Blässe; Tachycard; Hypoton

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; ggf. Ruhigstellung; steriles Abdecken; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I3; I13; I19 sowie H21; H22; H25;

48.
Inhalationstrauma

Verbrennung / Verbrühung der Schleimhaut des respiratorischen Traktes mit vitaler Gefährdung

Symptome: ggf. Schmerzen in den betroffenen Bereichen; Schwärzung an Mund und Nase; verkohlte Nasenhärchen; ggf. vegetative Symptomatik; ggf. Dyspnoe

Diagnostik: RR; Puls; EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung;

Therapie: Lagerung; Beruhigen; Atemwegs-Sicherung; ggf. steriles Abdecken; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I7; I11; I25 sowie H5; H14; H24;

49.
Verätzung

Gewebeschädigung durch eine Säure oder Lauge

Symptome: ggf. Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik;

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; Auskultation; SaO₂; ggf. BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; ggf. steriles Abdecken; ggf. i.v. Zugang; ggf. Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I5; I27; sowie H3; H17; H28;

50.
Verätzung (schwer)

Schwerwiegende Gewebeschädigung durch eine Säure oder Lauge

Symptome: ggf. Schmerzen in den betroffenen Bereichen; ggf. vegetative Symptomatik;
Ggf. Schweißig; Blässe; Tachycard; Hypoton

Diagnostik: RR; Puls; ggf. EKG; Auskultation; SaO₂; BZ-Messung; ggf. DMS

Therapie: Lagerung; Beruhigen; ggf. steriles Abdecken; i.v. Zugang; Infusion; ggf. Medikamente, weitere ärztliche Therapie veranlassen

Kombinierbar mit: I2; I29; I34 sowie H10; H15; H26;

Mögliche Szenarien um die sozialen Kompetenzen zu prüfen:

1. Patient spricht kein Deutsch
2. Patient ist dement
3. Patient ist minderjährig
4. Patient pflegt einen Angehörigen
5. Patient ist alkoholisiert
6. Patient hat eine Persönlichkeitsstörung
7. Patient ist eines anderen Glaubens, welcher gewisse medizinische Maßnahmen nicht ermöglicht.
8. Patient möchte nicht in ein Krankenhaus
9. Angehörige sind alkoholisiert
10. Angehörige können keine vernünftigen Auskünfte geben
11. Angehörige sind ängstlich
12. Angehörige können nicht alleine bleiben (Kinder / Alte Menschen etc.)
13. Angehörige sind aggressiv
14. viele Schaulustige, die alles besser wissen
15. Helfer die sich aufdrängen
16. Patientenverfügung
17. Hausarzt vor Ort
18. Patient ist Palliativpatient
19. Die häusliche Versorgung ist nicht gewährleistet
20. Patient ist sehr fordernd (weit entferntes Wunsch KH)
21. adäquater Umgang mit Ersthelfern
22. Patient ist taub und / oder stumm

23. Patient ist depressiv oder hat suizidale Tendenzen
24. Patient ist blind
25. Patient ist unkooperativ
26. Sonstige „Dritte“ vor Ort
27. Patient hat eine Behinderung
28. Patient ist adipös